

Description d'une nouvelle espèce  
du genre **Littorina**, provenant des côtes de la **Tunisie**,

Par Ph. DAUTZENBERG.

Je possède, depuis plusieurs années, des spécimens recueillis par M. F. de Nerville, au sud de Sfax, d'un *Littorina* qu'il ne m'a été possible d'identifier avec aucune des espèces connues de ce genre. M. Ed. Chevreux vient de m'envoyer d'autres exemplaires de la même forme, trouvés par lui sur la côte occidentale de l'Ile de Djerba, au sud de Sidi-Jamur. Il est donc bien certain que ce Mollusque appartient à la faune du golfe de Gabès.

LITTORINA NERVILLEI, Dautzenberg (Pl. I, fig. 4).

*Testa 6 millim. alta, 4 1/2 millim. lata, imperforata, parum solida. Spira conoidea. Anfractus 5 convexi; sutura impressa. Primi anfractus læves, cæteri funiculis transversis inæqualibus ac striis incrementi obliquis muniti. Apertura rotundata, marginibus callo tenui, nitente, junctis. Columella arcuata, planata; labrum acutum. Color fulvus, maculis albidis subquadratis tessellatus.*

Coquille imperforée, peu épaisse. Spire conoïde élevée, composée de cinq tours convexes, séparés par une suture bien marquée. Tours embryonnaires lisses, les suivants garnis de cordons décurrents d'inégale grosseur et de stries d'accroissement obliques très fines et nombreuses. Ouverture arrondie. Columelle régulièrement arquée, plane et nettement limitée, reliée au sommet du labre par une callosité mince, luisante, appliquée. Labre simple, tranchant.

Coloration d'un fauve carnéolé parsemé de taches quadrangulaires blanchâtres disposées en séries décurrentes et qui donnent au dernier tour un aspect tessellé. Intérieur de l'ouverture d'un brun clair. — Opercule corné, mince, paucispire.



*Var. ex colore livida* (Pl. I, fig. 5).

Dans cette variété, le système de coloration est le même que chez le type; mais le fond est d'un gris bleuâtre plus ou moins foncé et le fond de l'ouverture est d'un brun marron.

Le *L. Nervillei* ne ressemble un peu au *L. punctata*, Gmelin, que par sa coloration : sa forme est tout à fait différente. Son test mince, ses tours convexes, son ouverture arrondie ne permettent en aucune façon de l'assimiler à cette espèce. Par contre, le *L. Nervillei* peut être rapproché du *L. tenebrosa*, Montagu, de l'Océan Atlantique; mais il est plus petit, de forme plus élancée; ses tours sont plus convexes et sa columelle est plus aplatie.

P. D.

---

### Unionidæ nouveaux ou peu connus,

Par H. DROUËT

(7<sup>e</sup> article)


#### 69. UNIO BARROISI, Drouët.

*C. oblongo-arcuata, convexa, crassa, ponderosa, striato-lamellosa, nigra; margo dorsualis arcuatus; margo ventralis retusus vel sinuatus; pars postica elongatissima, in rostrum attenuato-decurvatum producta; nates prominentes, multiplicatulae; ligamentum crassum; dens valvæ dextræ crassus, crenatus, supernè sulcatus; dentes valvæ sinistræ depressi, sulcati; lamellæ validæ; impressiones anticæ excavatæ; margarita albido-plumbea, sub lente subtiliter crispata. — Long. 90-115; alt. 50-55; diam. 30-32 mill.*

*Hab.* Le Nahr-el-Haroun, affluent de l'Oronte, à Zerrâa : Syrie (Dr Théod. Barrois). Abondant.

Espèce remarquable par sa taille, son épaisseur, son poids, son épiderme noir ou noirâtre, ses stries rugueuses





Arnoul del.

Imp. Becquet. Paris.

- |  |   |
|--|---|
| 1. <i>Bulimulus Chaperi</i> , Crosse et Fischer.   | 3. <i>Perideris Lechatelieri</i> , Dautzenberg. |
| 2. Le même avec l'animal.                          | 4. <i>Littorina Nervillei</i> , Dautzenberg.    |
| 5. <i>Littorina Nervillei</i> , var., Dautzenberg. |   |